

Link do produktu: <https://www.sale-animals.pl/adtab-tabletka-na-pchly-kleszcze-dla-kota-2-8-kg-smakowa-p-774.html>



Adtab tabletka na pchły kleszcze dla kota 2-8 kg smakowa

Cena	32,87 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny

Opis produktu

AdTab - tabletka dla kota zapewniająca ochronę przed pchłami i kleszczami

AdTab to niewielka, smaczna tabletka do żucia dla kotów, która skutecznie zwalcza pchły i kleszcze.

AdTab to mała, smaczna tabletka do rozgryzania i żucia dla kotów, która szybko zwalcza kleszcze i pchły. Jest dobrze tolerowana, skuteczna i zaczyna działać już po 8 godzinach. Działanie AdTab **utrzymuje się przez cały miesiąc**, a ponieważ zaakceptowało go 100% kotów biorących udział w badaniach, możesz mieć pewność, że zawsze odpowiednio dbasz o swojego kota.

Lek jest odpowiedni dla wszystkich **kociąt i kotów w wieku od ośmiu tygodni i o masie ciała powyżej 0.5 kg** i został przebadany pod kątem bezpieczeństwa, a w badaniach klinicznych nie zaobserwowano interakcji substancji czynnej, lotilaneru, z innymi lekami często stosowanymi u zwierząt. AdTab to szybkie i wygodne rozwiązanie dostępne bez recepty.

Tabletka dla kotów AdTab:

- zapewnia ochronę przed pchłami i kleszczami
- jest dostępna bez recepty w lecznicach weterynaryjnych i sklepach zoologicznych
- może być stosowana u kociąt od 8 tygodnia życia i masie ciała minimum 0.5kg
- wygodna do podania
- jedna tabletka chroni przez okres do 1 miesiąca

Jak działa AdTab dla kotów?

W szeroko zakrojonych badaniach wykazano, że w zalecanych dawkach zastosowana substancja czynna jest wysoce skuteczna i dobrze tolerowana przez koty. Substancja czynna zawarta w produkcie AdTab powoduje nadmierną stymulację układu nerwowego pcheł i kleszczy, co w krótkim czasie skutkuje ich śmiercią. Tabletka zabija pchły znajdujące się na psie przed podaniem produktu w ciągu 6 godzin, a kleszcze znajdujące się na psie przed podaniem produktu w ciągu 8 godzin. Oddziałuje wyłącznie na pchły i kleszcze, a nie na psy ani ludzi i działa przez cały miesiąc.

Jak podawać AdTab kotu?

1. Wybierz adekwatny do wzrostu i wagi Twojego kota produkt AdTab
2. Wyjmij tabletkę z opakowania

3. Umieścić tabletkę w kocięj karmie lub pozwolić kotu wziąć ją z ręki

4. Aby uzyskać pełną skuteczność, upewnij się, że podajesz tabletkę w trakcie karmienia kota lub w ciągu 30 minut od ostatniego karmienia

Aby zabezpieczyć kota w wieku powyżej 8 tygodni przed pchłami i kleszczami, **należy dobrać produkt AdTab odpowiedni do masy ciała kota** i w celu zapewnienia pełnej skuteczności podać mu tabletkę z karmą lub w ciągu 30 minut od karmienia. Wybierając właściwą moc leku dla kota, należy kierować się poniższymi wytycznymi:

- koty o masie ciała powyżej 2 kg do 8 kg: tabletki AdTab 48 mg lotilaneru

Przeciwwskazania

Nie stosować w przypadkach nadwrażliwości na substancję czynną lub na dowolną substancję pomocniczą.

Specjalne ostrzeżenia

Pasożyty muszą rozpocząć odżywianie na żywicielu, by wejść w kontakt z lotilanerem, dlatego nie można całkowicie wykluczyć ryzyka wystąpienia chorób przenoszonych przez te pasożyty. Należy wziąć pod uwagę możliwość, że inne zwierzęta żyjące w tym samym gospodarstwie domowym mogą być źródłem ponownej inwazji pcheł i w razie potrzeby należy je leczyć odpowiednim produktem. Wszystkie stadia rozwojowe pcheł mogą bytować w posłaniu oraz w miejscach regularnego odpoczynku psa tj. dywany i obicia mebli. W przypadku masowej inwazji pcheł oraz na początku procesu zwalczania, w tych obszarach powinny być zastosowane odpowiednie produkty przeznaczone do użycia w środowisku i następnie obszary te powinny być regularnie odkurzone.

Specjalne środki ostrożności dotyczące bezpiecznego stosowania u docelowych gatunków zwierząt:

Wszystkie dane na temat bezpieczeństwa i skuteczności uzyskano badając koty i kocięta w wieku 8 tygodni i starsze oraz o masie ciała minimum 0.5kg. W związku z brakiem dostępnych danych, przed rozpoczęciem leczenia kociąt młodszych niż 8 tygodni i/lub o masie ciała mniejszej niż 0.5kg, należy skonsultować się z lekarzem weterynarii.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających weterynaryjny produkt leczniczy zwierzętom:

Po zastosowaniu produktu należy umyć ręce. Po przypadkowym połknięciu należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie.

Specjalne środki ostrożności dotyczące ochrony środowiska - nie dotyczy.

Działania niepożądane

Bardzo rzadko (< 1 zwierzę/10 000 leczonych zwierząt, włączając pojedyncze raporty):

- biegunka, wymioty, Brak apetytu, ospałość; Ataksja, drgawki, drżenia

Zgłaszanie działań niepożądanych jest istotne, ponieważ umożliwia ciągłe monitorowanie bezpieczeństwa stosowania weterynaryjnego produktu leczniczego. Zgłoszenia najlepiej przesłać za pośrednictwem lekarza weterynarii do właściwych organów krajowych lub do podmiotu odpowiedzialnego lub za pośrednictwem krajowego systemu zgłaszania. Patrz również punkt "Dane kontaktowe" w ulotce informacyjnej.

Stosowanie w ciąży, podczas laktacji lub w okresie nieśności:

Ciąża i laktacja - badania laboratoryjne u szczurów nie wykazały żadnych dowodów na działanie teratogenne ani jakiegokolwiek działania niepożądane mające wpływ na zdolność reprodukcyjną samców i samic. Przed rozpoczęciem leczenia zwierząt w ciąży lub podczas laktacji należy skonsultować się z lekarzem weterynarii.

Płodność - przed rozpoczęciem leczenia psów przeznaczonych do rozrodu należy skonsultować się z lekarzem weterynarii.

Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji:

Nieznane. Podczas badań klinicznych nie obserwowano interakcji lotilaneru z rutynowo stosowanymi produktami leczniczymi weterynaryjnymi.

Objawy przedawkowania (oraz sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy i odtrutki, w stosownych przypadkach):

Nie obserwowano występowania działań niepożądanych u szczeniąt w wieku 8-9 tygodni i masie ciała 1,3-3,6 kg, po ośmiokrotnym podaniu doustnym (w jednomiesięcznych odstępach) dawek przekraczających do pięciu razy najwyższą dawkę zalecaną (43 mg, 129 mg i 215 mg lotilaneru/kg m.c.).

Szczególne ograniczenia dotyczące stosowania i specjalne warunki stosowania, w tym ograniczenia dotyczące stosowania przeciwdrobnoustrojowych i przeciwpasożytniczych weterynaryjnych produktów leczniczych w celu ograniczenia ryzyka rozwoju oporności - nie dotyczy.

Okresy karencji - nie dotyczy.

- UWAGA - Zgodnie z art. 96 ust. 7 i 8 ustawy - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 ze zm.) produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne (...), co do zasady, nie podlegają zwrotowi. Podobnie jest w przypadku sprzedaży wysyłkowej.
- Zgodnie z art. 68 ust. 3l i 3m ustawy - Prawo farmaceutyczne, produkty lecznicze (...) wydawane w ramach wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych nie podlegają zwrotowi.
- UWAGA! Zgodnie z obowiązującymi przepisami, produkt jest dostępny do sprzedaży tylko w przypadku odbioru osobistego lub zlecenia odbioru w wybranej firmie kurierskiej.
- Ten produkt znajduje się na liście OTC i dlatego nie może być sprzedawany przez sklep do gabinetów weterynaryjnych oraz sklepów zoologicznych. Faktura za zakup tego produktu może być wystawiona TYLKO z oświadczeniem od klienta, że jest to zakup na użytek własny, a nie do dalszej odsprzedaży.