

Link do produktu: <https://www.sale-animals.pl/drontal-dla-kota-2-tabletki-na-odrobaczenie-p-333.html>



Drontal dla Kota 2 tabletki na odrobaczenie

Cena	24,99 zł
Cena poprzednia	27,99 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny

Opis produktu

To co to właściwie jest ten Drontal?

Drontal Dog Flavour to lek odrobaczający dla psów. Działa skutecznie przeciwko wszystkim typom robaków jelitowych.

Badania* dowiodły, że zawierające substancję smakową tabletki Drontal są chętnie przyjmowane przez psy. Teraz Drontal dla psów ma formę smaczkowej kostki.

To skąd się one tutaj wzięły, te pasożyty?

Psy i koty mogą się zarazić pasożytami na wiele sposobów:

- ze skażonego larwami i/lub jajami środowiska
- od matki, w okresie ciąży i/lub laktacji
- jedząc surowe mięso
- przez pchły

To jak się podaje ten Drontal?

Drontal jest tak smaczny, że może być podawany bez jedzenia, ale jeśli pies lub kot ma inne upodobania smakowe, to wtedy należy podać go z jedzeniem.

To jest bardzo ważne dla psów, kotów i ludzi

- Nawet psy i koty, które nie wychodzą z domu, mogą mieć robaki.
- Domowe sposoby na odrobaczanie nie są skuteczne.
- Psy i koty mogą być zarobaczone nawet wtedy, gdy mają dobry apetyt.

To jak często odrobaczają, żeby było jak najlepiej?

Psy i koty należy odrobaczać co 3 miesiące (4 razy do roku, zgodnie z rekomendacją ESCCAP**). Dla skutecznego odrobaczania Drontal podawaj co 3 miesiące.

x4/1rok

Dali mu Drontal!

To na nas już czas

Ty, skąd mamy tego psa?

Z parku

*Patrz ulotka przytlekowa.

więcej na: zdrowyfutrzak.pl i escap.pl

Drontal tabletki odrobaczające dla kota na pasożyty

Tabletki odrobaczające dla kota 2 szt.

Wskazania lecznicze:

- **Odrobaczenie kota**

-
- **Tabletki odrobaczające dla kota Drontal** przeznaczone są do zwalczania inwazji nicieni i tasiemców przewodu pokarmowego kotów, takich jak: *Toxocara cati*, *Ancylostoma tubaeforme*, *Ancylostoma braziliense*, *Echinococcus multilocularis*, *Dipylidium caninum*, *Taenia taeniformis*, *Mesocystoides* spp., *Joyeuxiella* spp.

Przeciwwskazania:

- Kocięta poniżej 3 tygodnia życia.
- Kotki w pierwszych dwóch trymestrach ciąży.

Sposób użycia:

- **Drontal tabletki odrobaczające** należy podawać jednorazowo, najlepiej w kawałku mięsa, kielbasy lub innego smakołyku.
- Można go też dzielić, rozgniatać i mieszać z karmą.
- Może być stosowany bez względu na rodzaj diety.
- 1 tabletkę na 4kg wagi kota.
- Dawka lecznicza to 5 mg/kg m.c. prazikwantelu i 57,5 mg/kg m.c. embonianu pyrantelu co odpowiada 1 tabletkę na 4 kg m.c. doustnie.
- W przypadku zakażenia glistami u kociąt po pierwszym podaniu preparatu może nie dojść do całkowitej eliminacji pasożytów, w takim przypadku należy podać **tabletki odrobaczające dla kota** po 2-3 tygodniach od momentu odstawienia od matki. Należy zachować 14 – dniowe odstępy między kolejnymi podaniami preparatu.
- W przypadku zakażenia *Echinococcus* spp. należy zastosować dodatkową ochronę osób kontaktujących się z odrobaczanymi kotami.

Nazwa produktu: Drontal, 230 mg / 20 mg, tabletki powlekane dla kotów

Drontal tabletki odrobaczające dla kota najlepiej podawać po wcześniejszych konsultacjach z lekarzem weterynarii.

Informacje z ulotki: Specjalne ostrzeżenia dotyczące stosowania u każdego z docelowych gatunków zwierząt

W celu ograniczenia ryzyka ponownej inwazji wszystkie zwierzęta bytujące razem powinny być leczone w tym samym czasie. Po każdym zabiegu odrobaczania należy oczyścić środowisko, w którym przebywają (np. legowiska i ich otoczenie), a zwłaszcza usunąć pozostawione odchody. Pchły są żywicielami pośrednimi jednego z powszechnie występujących tasiemców, *Dipylidium Caninum*. Inwazja tasiemców będzie nawracała, jeśli nie zostanie przeprowadzone zwalczanie żywicieli pośrednich - pcheł! Na skutek częstego, powtarzanego używania preparatów z tej samej grupy środków przeciworobaczych może dojść do wykształcenia się oporności pasożytów na środki należące do danej grupy. W razie podejrzenia braku skuteczności należy przeprowadzić odpowiednie badania laboratoryjne (test redukcji liczby jaj w kale) lub zastosować środek przeciwpasożytniczy o innym mechanizmie działania.

Specjalne środki ostrożności przy stosowaniu: Przed stosowaniem u zwierząt w złym stanie ogólnym lub wykazujących objawy silnego zarobaczenia, należy zwrócić się o poradę lekarza weterynarii. Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom: Z uwagi na względy higieniczne, po podaniu kotu tabletek należy umyć ręce. W sytuacji przypadkowego połknięcia, szczególnie w przypadku dzieci, należy zwrócić się o poradę medyczną pokazując lekarzowi ulotkę informacyjną lub etykietę. Pasożyty wewnętrzne psów i kotów mogą stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia ich właścicieli. Pamiętając, że formy inwazyjne zdolne do zarażenia ludzi znajdują się w odchodach zawsze po odrobaczaniu należy starannie oczyścić z nich miejsce bytowania zwierzęcia (poprzez np. zakopanie lub wrzucenie do specjalnego pojemnika na tego typu odp. Nie należy stosować produktu u kotek będących w tym okresie ciąży. Może być stosowany w czasie laktacji.

Preparat jest kombinacją embonianu pyrantelu skutecznego przeciwko testowanym

gatunkom nicieni żołądkowo jelitowych, w szczególności *Toxocara cati*, *Toxascaris leonina*, *Ancylostoma* spp. oraz prazikwantelu działającego przeciwko tasiemcom, w tym *Hydatigera (Taenia) taeniaeformis*, *Joyeuxiella* spp., *Dipylidium caninum*, *Mesocostoides* spp. i *Echinococcus multilocularis*.

Embonian pyrantelu działa agonistycznie w stosunku do acetylocholiny. Powoduje nieodwracalny blok depolaryzacyjny w obrębie synaps nerwowo-mięśniowych, co prowadzi do porażenia spastycznego ciała pasożyta i w efekcie do jego śmierci. Prazikwantel jest skuteczny przeciwko wszystkim stadiom rozwojowym robaków płaskich występujących w przewodzie pokarmowym kotów. Powoduje poważne uszkodzenia powłoki ciała pasożytów, które zarówno w badaniach *in vivo* jak i *in vitro* rozwijają się bardzo szybko, i powodują skurcze ciała oraz porażenie pasożyta. Podstawą mechanizmu działania prazikwantelu jest zmiana przepuszczalności powłok ciała dla jonów wapniowych, co prowadzi do raptownego kurczenia się strobili, redukcji wchłaniania glukozy, wyczerpania się rezerw energetycznych w ciele pasożyta, porażenia i śmierci.

Embonian pyrantelu bardzo słabo wchłania się z przewodu pokarmowego i wydalany jest głównie z kałem. Po podaniu doustnym, u wszystkich badanych gatunków zwierząt, prazikwantel jest absorbowany bardzo szybko i niemal całkowicie z żołądka oraz jelita cienkiego. Maksymalny poziom w surowicy krwi osiąga w czasie od 0,3 do 2 godzin i jest błyskawicznie dystrybuowany do wszystkich organów. Z krwi przenika również do błony śluzowej przewodu pokarmowego, której komórki wydzielają go aktywnie, dzięki czemu łatwo dociera do „zakotwiczonych” w niej skoleksów. Prazikwantel wchłaniany jest bardzo szybko przez powłoki ciała pasożytów i równomiernie dystrybuowany w ich ciele.

Półokres eliminacji prazikwantelu znakowanego C14 i jego metabolitów wynosi od 2 do 3 godzin u wszystkich badanych gatunków. Prazikwantel jest bardzo szybko metabolizowany w wątrobie. Głównym metabolitem jest jego 4-hydroksycykloheksylowa pochodna. Prazikwantel, w postaci metabolitów, jest kompletnie eliminowany w ciągu 48 godzin - od 40 do 70% z moczem i od 13 do 30% poprzez żółć z kałem.

Okres ważności (w tym jeżeli jest to konieczne okres przydatności produktu leczniczego weterynaryjnego po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego/rozcieńczeniu lub rekonstytucji/dodaniu do pokarmu lub paszy granulowanej). 5 lat dla produktu leczniczego weterynaryjnego zapakowanego do sprzedaży.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C

Szczególne środki ostrożności dotyczące unieszkodliwiania nie zużytego produktu leczniczego weterynaryjnego lub odpadów pochodzących z tego produktu, jeżeli ma to zastosowanie: Niewykorzystany produkt leczniczy weterynaryjny lub jego odpady należy unieszkodliwić w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami. Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 240/96

Skład: Jedna tabletką zawiera: pyrantelu embonian 230 mg prazikwantel 20 mg

>> Produkty lecznicze nie podlegają zwrotowi; zwrot tego rodzaju produktów możliwy jest wyłącznie w przypadku wady jakościowej produktu lub jego niewłaściwego wydania. Podlega to regulacji art. 96 ustawy z dnia 6 września 2001r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008r., nr 45, poz. 271)