Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 01:43

Link do produktu: https://www.sale-animals.pl/dronspot-roztwor-do-nakrapiania-dla-srednich-kotow-o-masie-ciala-od-2-5-do-5kg-2x0-7ml-p-491.html



Dronspot - roztwór do nakrapiania dla średnich kotów o masie ciała od 2,5 do 5kg (2x0,7ml)

Cena	**54,87 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**

Opis produktu

DRONSPOT to innowacyjny preparat odrobaczający dla kotów w postaci **kropli na skórę** skuteczny przeciwko tasiemcom i nicieniom. **DRONSPOT** to pierwszy lek do odrobaczania kotów w postaci kropelek do nakrapiania **o statusie OTC**, czyli jest dostępny bez recepty również w sklepach zoologicznych.

Teraz zamiast stresować kota podróżą do weterynarza lub szykować się na walkę z kotem i tabletką, wystarczy kilka kropelek na kark – **raz na trzy miesiące.**

Jak podawać **DRONSPOT**?

1. Przed zastosowaniem produktu należy dokładnie zważyć kota, aby dobrać dla niego właściwa wielkość pipety.

2. Oddziel jedną pipetkę od opakowania. Trzymając pipetkę w pozycji pionowej, końcówka do góry, przekręć i zdejmij końcówkę, po czym użyj drugiej strony końcówki, aby zerwać zamkniecie.

3. Rozsuń kotu sierść na szyi, u podstawy czaszki tak, aby widoczna była odsłonięta skóra.

4. Przytknij koniec pipetki do skóry i mocno ściśnij kilkukrotnie pipetkę w celu wyciśnięcia jej zawartości bezpośrednio na skórę.

5. Nie głaszcz kota w miejscu podania preparatu, do czasu wchłonięcia.

Naniesienie produktu u podstawy czaszki ograniczy do minimum możliwość zlizania go przez kota.

Preparatu DRONSPOT nie należy stosować u kociąt
poniżej 8 tygodnia życia lub ważących mniej niż 0,5 kg.

SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNEJ(-YCH)

Każda pipetka 0,70 ml zawiera:
Substancje czynne:
Prazykwantel 60 mg
Emodepsyd 15 mg

Substancje pomocnicze:
Butylohydroksyanizol (E320) 3,78 mg

WSKAZANIA LECZNICZE
Leczenie mieszanych inwazji pasożytniczych u kotów spowodowanych przez następujące gatunki robaków obłych i robaków płaskich:

Robaki obłe (nicienie)
Toxocara cati (postaci dojrzałe, niedojrzałe, stadia larwalne L4 i L3)
Toxocara cati (stadia larwalne L3) – leczenie kotek w okresie późnej ciąży w celu zapobiegania przeniesieniu drogą laktogenną na potomstwo
Toxascaris leonina (postaci dojrzałe, niedojrzałe i stadia larwalne L4)
Ancylostoma tubaeforme (postaci dojrzałe, niedojrzałe i stadia larwalne L4)
Robaki płaskie (tasiemce)
Dipylidium caninum (postaci dojrzałe i niedojrzałe)
Taenia taeniaeformis (postaci dojrzałe)
Echinococcus multilocularis (postaci dojrzałe)

PRZECIWWSKAZANIA
Nie stosować u kociąt poniżej 8 tygodnia życia lub ważących poniżej 0,5 kg.
Nie stosować w przypadkach znanej nadwrażliwości na substancje czynne lub na dowolną substancję pomocniczą.

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania.

>> Produkty lecznicze nie podlegają zwrotowi; zwrot tego rodzaju produktów możliwy jest wyłącznie w przypadku wady jakościowej produktu lub jego niewłaściwego wydania. Podlega to regulacji art. 96 ustawy z dnia 6 września 2001r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008r., nr 45, poz. 271)
>> W przypadku zakupu produktu na fakturę Vat, zgodnie z przepisami odnośnie obrotu produktami leczniczymi, na fakturze Vat będzie widniała informacja "Produkt OTC nie przeznaczony do dalszej odsprzedaży".
Reklamację dotyczącą działania niepożądanego należy zgłaszać bezpośrednio u producenta:

https://reklamacje.weterynaria.bayer.com.pl/