Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 01:43

Link do produktu: https://www.sale-animals.pl/fiprex-75-xl-5-5ml-dla-psa-od-40-kg-do-55-kg-xl-p-364.html



FIPREX 75 XL 5,5ML dla psa od 40 kg do 55 kg XL

Cena	**19,99 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**

Opis produktu

Preparat do zwalczania pcheł, kleszczy, wszy i wszołów u psów o masie 40-60kg.

Produkt do zwalczania pcheł, kleszczy, wszy i wszołów u psów. W stosunku do pcheł wykazuje natychmiastowe działanie bójcze, kleszcze giną w ciągu 24-48 godzin. Preparat przenika w głąb skóry, gdzie równomiernie rozprzestrzenia się w warstwie lipidowej. Następnie przez gruczoły łojowe jest systematycznie uwalniany na powierzchnię naskórka - tworząc warstwę ochronną skutecznie zabezpieczającą przed ponowną inwazją ektopasożytów. Preparat zabezpiecza PSY przed kleszczami przez okres 3-5 tygodni i przed pchłami przez okres do 3 miesięcy.

Droga podania:

Zewnętrznie, bezpośrednio na skórę.

Dawkowanie:

- 1 tubka 1 ml (S - zawierająca 75 mg fipronilu) na psa o masie do 10 kg,
- 1 tubka 2 ml (M - zawierająca 150 mg fipronilu) na psa o masie 10-20 kg,
- 1 tubka 4 ml (L - zawierająca 300 mg fipronilu) na psa o masie 20-40 kg,
- 1 tubka 5,5 ml (XL - zawierająca 412,5 mg fipronilu) na psa o masie 40-60 kg,
- 2 tubki 5,5 ml dla psa o masie powyżej 60 kg.

Sposób podania:

Odkręcić zakrętkę tubki, następnie odgarniając sierść zwierzęcia nanieść zawartość odpowiedniej tubki - bezpośrednio na skórę, wzdłuż linii kręgosłupa - poczynając od miejsca między łopatkami a kończąc u nasady ogona (w przypadku psów o wadze do 20 kg wystarczy odgarniając sierść zwierzęcia, nanieść na skórę między łopatkami zawartość odpowiedniej tubki). Nie należy kąpać psa 2 dni przed oraz 2 dni po podaniu preparatu.

Warunki przechowywania:

Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze od +5°C do +25°C, z dala od ognia.

Ostrzeżenia:

Zaleca się wykonywać zabieg w gumowych rękawiczkach ochronnych. Podczas zabiegu nie pić, nie jeść i nie palić. Po zabiegu dokładnie umyć ręce. Zapobiegać lizaniu sierści przez zwierzęta bezpośrednio po zabiegu. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Wyłącznie dla zwierząt do użytku zewnętrznego.