Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 01:28

Link do produktu: https://www.sale-animals.pl/frontpro-tabletka-1-sztuka-dla-psa-smakowa-na-pchly-i-kleszcze-2-4-kg-roz-s-p-777.html



Frontpro Tabletka 1 sztuka dla psa smakowa na pchły i kleszcze 2-4 kg roz S

Cena	**35,50 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**

Opis produktu

Cena dotyczy 1 sztuki/ 1 tabletka.
FRONTPRO® to smaczna, łatwa do podania tabletka do rozgryzania i żucia, która zapewnia psom ochronę przed pchłami i kleszczami, przez pełen miesiąc. FRONTPRO® działa szybko od wewnątrz, zabijając to co na zewnątrz. Szybko zabija pchły, zanim jeszcze zdążą złożyć jaja, zabezpieczając nie tylko psa, ale i całe gospodarstwo domowe przed ponową inwazją pcheł. Wskazania lecznicze: Przeznaczona dla szczeniąt od 8 tygodnia życia i psów dorosłych o wadze 2-4 kg Leczenie inwazji pcheł u psów (Ctenocephalides felis i C. canis) - przez okres conajmniej 5 tygodni. Leczenie inwazji kleszczy u psów (Dermacentor reticulatus, Ixodes ricinus, Ixodes hexagonus, Rhipicephalus sanguineus) - przez okres do 1 miesiąca. Szczegółowa charakterystyka produktu: Mała tabletka do rozgryzania i żucia. Jest łatwa do podania i smaczna o aromacie pieczonej wołowiny, dzięki czemu pies zjada ją w kilka sekund. Działa szybko od wewnątrz - zabijając to co na zewnątrz. NATYCHMIASTOWA i SKUTECZNA OCHRONA: - działa szybko, zabijając kleszcze obecne na psie w ciągu 48h, a pchły w ciągu 8h, - działa od pierwszego podania. - 1 tabletka zapewnia pełen miesiąc ochrony. DODATKOWA OCHRONA: - zabija pchły szybko, zanim jeszcze zdążą złożyć jaja, - to zapobiega zanieczyszczeniu otoczenia, zabezpieczając nie tylko psa, ale i całe gospodarstwo domowe. BEZPIECZEŃSTWO: - można bezpiecznie stosować u szczeniąt, psów dorosłych u suk w ciąży oraz w czasie laktacji. SPRAWDZONE ROZWIĄZANIE: Lek oparty na zaufanej i sprawdzonej substancji czynnej. WYGODA STOSOWANIA: Tabletkę można podawać niezależnie od posiłku. ŁATWA DOSTĘPNOŚĆ: Lek dostępny bez recepty!. Sposób użycia: Podanie doustne. Jeśli pies nie akceptuje tabletek samodzielnie, można je podać z jedzeniem. Tabletek nie powinno się dzielić. Dla optymalnej kontroli inwazji pcheł i kleszczy produkt powinien być podawany w odstępach miesięcznych w okresach zagrożenia inwazją pcheł i/lub kleszczy. Konieczność i częstotliwość ponownego leczenia powinna uwzględniać lokalną sytuację epidemiologiczną oraz tryb życia zwierzęcia. Aby zapewnić prawidłowe dawkowanie, należy jak najdokładniej określić masę ciała zwierzęcia. Zbyt niska dawka może prowadzić do nieskutecznego działania i sprzyjać rozwojowi oporności. Nie stosować w przypadkach nadwrażliwości na substancję czynną lub na dowolną substancję pomocniczą. Skład: Substancja czynna: 1 tabletka zawiera: Afoksolaner 11,3mg Substancje pomocnicze: Skrobia kukurydziana, Białka sojowe drobnoziarniste, Aromat pieczonej wołowiny, Powidon (E1201), Makrogol 400, Makrogol 4000, Hydroksystearynian makrogolu 15 , Glicerol (E422), Triglicerydy o średnio długich łańcuchach Wielkość opakowania: 1 tabletka wysyłka dodatkowo w kopercie producenta lub woreczku strunowym z ulotką /opisem produktu. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH, 55216 Ingelheim/Rhein, Niemcy.
ADRES PRZEDSTAWICIELA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO Boehringer Ingelheim Sp. z o.o., ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3, 00-728 Warszawa Leki OTC nie podlegają zwrotowi oraz dalszej odsprzedaży. >> Produkty lecznicze nie podlegają zwrotowi; zwrot tego rodzaju produktów możliwy jest wyłącznie w przypadku wady jakościowej produktu lub jego niewłaściwego wydania. Podlega to regulacji art. 96 ustawy z dnia 6 września 2001r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008r., nr 45, poz. 271)

Producent

Producent

Boehringer Ingelheim (Sp. z o.o.)

Adres
ul. Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa

Polska

Kontakt: info.waw@boehringer-ingelheim.com

informacje o bezpieczeństwie

Środki przeciw pchłom i kleszczom są zazwyczaj bardzo dobrze tolerowane przez zwierzęta domowe i charakteryzują się szerokim marginesem bezpieczeństwa . Jednak, jak w przypadku każdego leku, możliwe są działania niepożądane. Należy obserwować objawy niepokoju, swędzenia, dolegliwości żołądkowo-jelitowych (wymioty lub biegunka), zaczerwienienia i podrażnienia skóry.